

description exercise 6회 답안입니다.

1 개의 메일

송주혜 <joohe.song@samsung.com>

2017년 8월 14일 오후 11:44

답장 주소: joohe.song@samsung.com

받는사람: "stomachlee@gmail.com" <stomachlee@gmail.com>

교수님, 지난번 description exercise 5회를 하고 나니, 내시경 병변을 보고 description 하는 것이

생각보다 어렵고, 반복적인 연습이 필요하다는 생각이 절실히 듭니다. 이번 6회 첨삭해주신 것 보고 더 열심히 하겠습니다.

지난 1-4회 exercise 도 짬짬이 해보려고 하나, 현재 endotoday 홈페이지가 접속이 되지 않아, 아쉽습니다.

혹시 다른 방법으로, 문제를 받을 방법이 있을지요?

교수님 늘 감사합니다.

송주혜 드림

송주혜 선생님. 처음이라 어렵게 느꼈지만 꼭 따라하다보면 익숙해질 것이라. 교과서도 뒤려 가려 하시어 EndoTODAY는 기간간 minor 개편 후 다시 open 하였습니다. 2017-8-15 이준행

9

36. GE junction 근방에서 2cm hernia sac이 관찰되며, sac 근처 2군데 ulcer scar가 보입니다. gastric fold가 hernia sac 근처로 converging되어 있습니다.

> paraesophageal hernia

좋아요. 설명은 언제나 꼭 읽어보고 아울러 YOUTUBE 동영상강의를 보시기 바랍니다.

X

37. GE junction 보다 proximal part에서 SCJ 이 확인됩니다.

> Barrett esophagus C2M5

앗! 암인데!!! Barrett는 필수 평판함.

9

38. LC side of LB에서 ulcer가 보이며, nonbleeding exposed vessel 이 확인됩니다. MB PW에서 BGU가 보이며, spurting blood 가 관찰됩니다.

>원)BGU, Forrest IIa  
오)BGU, Forrest Ia

같은 병소인데 검사 도중 때가 난 것이라. 레임은 식원의 큰 출혈!!! Dieulafoy라 하시다.

9

duodenal bulb and proximal second part에 다양한 크기의 multiple erosion 이 확인됩니다.

> duodenal erosion  
r/o Zollinger-Ellison SD

Very Good. 내시경수면과 함께 제시되는 잠수입상수면은 늘 중요합니다.

9

40. angle의 center에 1.5cm sized ulcer 가 보입니다. margin은 비교적 sharp 하고, edge는 edematous 합니다. 이후 재생상피가 관찰되면서 healing 되어 보입니다.

>BGU A2 -> H1 (R/o recurrent)

레임의 ulcer 자체수면과 주변수면이 잘 맞지 않는다 싶으면 개방성 레임을 생각해보시어.

9

41. body 전반에서 두꺼워진 gastric fold 가 관찰되며, hyperemic mosaic pattern 이 확인됩니다. PW of HB 에서는 2cm 가량의 shallow depressed lesion 이 보이는데, margin이 불분명하며, nodularity가 동반되어 있습니다.

>AGC type IV

9

42. duodenum second part에 3cm 가량 diverticulum 이 보입니다.

> duodenal diverticulum

송주혜 선생님. 하나 빼고 다 맞았습니다. 수고하셔요.