

# 소화기 기생충 표준 처방

- 무증상 성인에서 발견된 경우도 동일 처방 -

## 1. 선충 (round worm)

- 1) 회충 (*Ascaris lumbricoides*): albendazole 400 mg 1회
- 2) 요충 (*Enterobius vermicularis*): albendazole 400 mg 3주 간격으로 3회
- 3) 편충 (*Trichuris trichiura*): albendazole 400 mg 1회
- 4) 구충 (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*): albendazole 400 mg 1회
- 5) 분선충 (*Strongyloides stercoralis*): (1) thiabendazole 25mg/kg 하루 1회 3일 (최선인데 약을 구하기 어렵다) 또는 (2) albendazole 400 mg 하루 1회 3일 또는 (3) ivermectin 200 ug/kg 1회
- 6) 개회충 (*Toxocara canis*): (1) 경과관찰 또는 (2) albendazole 400 mg 하루 2회 7일

[참고] Schmidt 교과서: Usually only patients with severe symptoms are treated.

## 2. 흡충 (fluke)

- 1) 간흡충 (*Clonorchis sinensis*): praziquantel 25 mg/kg 하루 3회 1일
- 2) 폐흡충 (*Paragonimus westermani*): praziquantel 25 mg/kg 하루 3회 2일
- 3) 요코가와흡충 (*Metagonimus yokogawai*): praziquantel 10 mg/kg 1회
- 4) 호르텐스극구흡충 (*Echinomonas hortense*): praziquantel 10 mg/kg 1회
- 5) 참굴큰입흡충 (*Gymnophalloides seoi*): praziquantel 10 mg/kg 1회
- 6) 간질 (*Fasciola hepatica*): triclabendazole 10 mg/kg 1-2회 (생산 중단 → 동물용만 있음)

## 3. 조충 (tapeworm)

- 1) 유구조충 (*Taenia solium*): praziquantel 10 mg/kg 1회  
[참고] 유충인 유구낭미충에 의한 유구낭미충증(cysticercosis)에서는 장기간 투약한다
- 2) 무구조충 (*Taenia saginata*): praziquantel 10 mg/kg 1회
- 3) 아시아조충 (*Taenia asiatica*): praziquantel 10 mg/kg 1회
- 4) 광절열두조충 (*Diphyllobothrium latum*): praziquantel 10 mg/kg 1회

## 4. 원충 (protozoa)

- 1) 이질아메바 (*Entamoeba histolytica*): metronidazole 500 mg 하루 3회 7-10일
- 2) 람블편모충 (*Giardia lamblia*): metronidazole 250 mg 하루 3회 5-7일
- 3) 질편모충 (*Trichomonas vaginalis*): metronidazole 250 mg 하루 3회 7일