

[삼성서울병원 장정결제 - 2016.10.14]

제품명(코드) 회사	성분	복용법(량)	주의 및 금기
<b>Colonyte</b> (COL-S) 알보젠코리아	PEG Sodium Sulfate Anhydrous Sodium Bicarbonate Potassium Chloride Sodium Chloride	조제액 4L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amiloride, spironolactone 병용금기 (고칼륨혈증 유발가능)</li> <li>2. 페닐케톤뇨증 환자에는 투여 금기 (아스파탐은 체내에서 페닐알라닌으로 대사)</li> </ol>
<b>Colyte -F(R)</b> (COL2-S) 태준	PEG Sodium Bicarbonate Sodium Chloride Potassium Chloride	조제액 2L (일반 장정결시는 2개 처방→ 총 4L 복용) (주로 추가 장정결이 필요할때 또는 캡슐내시경시)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amiloride, spironolactone 병용금기 (고칼륨혈증 유발가능)</li> <li>2. 페닐케톤뇨증 환자에는 투여 금기 (아스파탐은 체내에서 페닐알라닌으로 대사)</li> </ol>
<b>Clicool(R)</b> (COOLP-S) 한국파마	PEG Sodium Sulfate Anhydrous Potassium Chloride Sodium Chloride Sodium Ascorbate Ascorbic Acid	총 3L = 조제용액 1L + 물500ml + 조제용액 1L + 물500ml	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amiloride, spironolactone 병용금기 (고칼륨혈증 유발가능)</li> <li>2. Glucose-6-phosphate dehydrogenase 결핍이 있는 경우 주의(Ascorbic acid 독성)</li> <li>3. 페닐케톤뇨증 환자에는 투여 금기 (아스파탐은 체내에서 페닐알라닌으로 대사)</li> </ol>
<b>Suprep(R)</b> (SPREP-S) 태준	Sodium Sulfate Potassium Sulfate Magnesium Sulfate	총 2.8L (약 3L) =[(solution 177ml+물 296ml) + 물 473ml x 2] x 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 중증의 신장애 환자 투여금지 (GFR &lt;30ml/min/1.73m<sup>2</sup>)</li> <li>2. Amiloride, spironolactone 병용금기 (고칼륨혈증 유발가능)</li> </ol>

<b>Picosolution</b> <b>(PICO-S)</b> <b>한국팜비오</b>	Sodium picosulfate Citric acid hydrate Magnesium Oxide 아스파탐(인공감미제)	총 2.34L (약 2-2.5L) <b>(2병 처방해야 함)</b> = (solution 170ml x 2) +시간당 250ml 물섭취	1. 고마그네슘 혈증 환자 금기 2. 증증 심부전 환자에서 마그네슘 축적 가능하므로 금기 3. 페닐케톤뇨증 환자에는 투여 금기 (아스파탐은 체내에서 페닐알라닌으로 대사)
--	---	--	---

- 장정결제 복용시 탈수 등에 의한 전해 질 이상이 가능하므로 이뇨제, 안지오텐신 전환효소(ACE) 저해제 등 전해질 이상 위험을 증가시키는 약물을 사용하거나 저나트륨혈증 또는 의심 환자에서는 주의가 필요함.
- 장폐색, 천공의심, 심한 장염에서 금기
- 탈수증이나 증증 심부전 환자 금기